



6-11歲兒童 莫德納(Moderna) 疫苗接種

莫德納兒童疫苗

♥ 家長篇 1

- ❖ 不含活病毒，不會引起COVID-19。
- ❖ 已在許多國家施打，有效性和安全性也於臨床試驗測試得到證實。

接種兒童疫苗的目的

- ❖ 兒童感染COVID-19/Omicron多數是輕症，但也有少部分嚴重症狀，甚至死亡。所以建議6-11歲兒童接種，以降低重症、併發症與死亡風險。

基礎劑用法與劑量

- ❖ 施打2劑，每劑0.25mL(含50微克mRNA，成人劑量的一半)，2劑施打間隔12週。



不適合接種者



- ❖ 正在發燒或對mRNA疫苗成分有過敏的兒童。
- ❖ 先前有接種Moderna或輝瑞BNT COVID-19疫苗引起的任何嚴重不良事件，但未確定原因的兒童。

需經醫師討論確認是否接種或接種時間點者

- ❖ 先前接種Moderna或輝瑞BNT COVID-19疫苗成分有過敏反應的兒童。
- ❖ 過去3個月內曾罹患有心肌炎或心包炎（心臟炎症）的兒童。
- ❖ 有出血性疾病或正在服用抗凝血劑的兒童。
- ❖ 接受免疫抑制劑治療（包括化療）的兒童。
- ❖ 有急性風濕熱、急性風濕性心臟病或急性失償心臟衰竭的兒童。
- ❖ 對其他疫苗或其他藥物有過敏反應的兒童。



6-11歲兒童 莫德納(Moderna) 疫苗接種

接種後副作用



家長篇

2

❖ 輕度到中度副作用：

出現機率依序為：接種部位局部疼痛，疲倦、頭痛、寒顫、肌肉疼痛、噁心/嘔吐、發燒等；一般在接種後1-2天會自行消失。

❖ 罕見嚴重副作用：

心肌炎、心包膜炎、嚴重過敏反應，但目前尚未有兒童心肌炎/心包膜炎個案，若發生此極罕見之不良反應，相關症狀也都較輕微，會隨著時間逐漸緩解。



接種後照顧

- ❖ 注射後兒童可以如常活動，視副作用做必要休息。
- ❖ 必要時可以使用症狀緩解藥物（如解熱、陣痛藥物等）。
- ❖ 注射部位腫脹，可以局部冷/冰敷。

疫苗接種2周後才能產生免疫力，故注射後仍需落實勤洗手、戴口罩等防疫措施

接種後「需立即就醫」徵象



- ❖ 持續發燒超過48小時活力變差。
- ❖ 幾天後仍未消失的常見疫苗副作用，如：頭痛、發冷等。
- ❖ 嚴重過敏反應症狀：呼吸困難、氣喘、面部或喉嚨腫脹、眩暈、心跳加速、虛脫、全身紅疹等不適症狀。
- ❖ 疑似心肌炎或心包膜炎症狀：胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸（如心跳不規則、心跳過快、顫動）、暈厥/昏厥、呼吸急促、運動耐受不良（如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）。