

認識莫德納兒童疫苗

一種防止感染新冠肺炎的疫苗，不含活病毒，不會因注射而引起COVID-19。

許多國家已施打，有效性和安全性也於臨床試驗測試得到證實。

為什麼我需要施打莫德納兒童疫苗？

少部分兒童感染新冠肺炎後會有很嚴重的症狀，重症甚至死亡，所以建議6-11歲兒童接種疫苗，以避免這樣的情況發生。

莫德納兒童疫苗要打幾次？什麼時候打？

疫苗需要施打兩次，兩次之間要間隔12週。

什麼狀況是不適合接種疫苗？

當我要打疫苗時，正在發燒。

我對疫苗成分有過敏。

我先前打莫德納或輝瑞兒童疫苗後有發生嚴重不良反應，醫生叫我特別注意。

6-11歲莫德納疫苗接種

兒童篇

我最近有生病或吃藥，可不可以打莫德納兒童疫苗？

如果你有以下情況，請跟醫師討論是否可接種疫苗，以及何時可接種疫苗。

我對其他疫苗或其他藥物有過敏反應。

我先前注射莫德納或輝瑞兒童疫苗有過敏反應。

我過去三個月內曾罹患有心肌炎或心包炎（心臟炎症）。

我有出血性疾疾病或正在服用抗凝血劑。

我有接受免疫抑制劑治療（包括化療）。

我有急性風濕熱、急性風濕性心臟病或急性失償性心臟衰竭。

接種後的副作用（不舒服）

輕度到中度副作用

接種部位局部疼痛、疲倦、頭痛、寒顫、肌肉疼痛、噁心、嘔吐、發燒等；一般在接種後1-2天會自行消失。

罕見嚴重副作用

心肌炎、心包膜炎、嚴重過敏反應，但目前尚未有兒童心肌炎/心包膜炎個案，若發生此極罕見的不良反应，相關症狀也都比較輕微，會隨著時間逐漸緩解。

接種後的照顧

注射後你可以像平常般活動，依據不舒服程度做必要休息。

必要時可以用醫藥師開立的症狀緩解藥物（如解熱、陣痛藥物等）。

注射部位腫脹，可以用局部冷敷/冰敷。

接種後哪些情況需要趕快告訴父母並立即就醫？

持續發燒超過48小時，活力變差。

不舒服症狀像是頭痛、發冷等，持續幾天沒有消失。

嚴重過敏反應症狀

呼吸困難、氣喘、面部或喉嚨腫脹、眩暈、虛脫、心跳加速、全身紅疹等不舒服症狀。

疑似心肌炎或心包膜炎症狀

胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸（如心跳不規則、心跳過快、顫動）、暈厥、昏厥、呼吸急促、運動耐受力不良（如走幾步路就會喘、沒有力氣爬樓梯）。

疫苗接種2週後才能產生免疫力，所以注射後仍須落實勤洗手、戴口罩等防疫措施。